

## **BLATTE AMERICAINE (Periplaneta americana)**

Famille: Blattidae  
Ordre: Dictyoptera

### **Généralités:**

- très répandue en Afrique tropicale à l'extérieur et dans les bâtiments.
- En France, se trouve dans les usines, restaurants, mais surtout dans des endroits chauds et humides (égouts).



### **Apparence:**

- Imago: brun, mais jaune clair près du bord du pronotum; taille 28-44 mm; les mâles ont des antennes dépassant l'abdomen; courts vols planés observés par fortes chaleurs.
- larve: même apparence que l'imago, mais sans ailes; brun clair; mue entre 7 et 13 fois.
- oeuf: l'oothèque mesure environ 8x5x2 mm; contient en moyenne 16 (6-28) oeufs.

### **Développement:**

- métamorphose incomplète.
- stade ovaire: 5 semaines à 30°C; 7 semaines à 25°C; les femelles adultes produisent en moyenne de 20 à 60 oothèques dans leur vie, qui sont déposées après 1 à 6 jours dans un endroit dissimulé favorable.
- stade larvaire: 5-9 mois à env. 30°C; par températures plus basses, plus d'un an.
- de l'œuf à l'imago: 6-10 mois à 30°C et plus d'un an par températures plus basses.
- longévité maximale: imago 2 ans.

### **Mode de vie:**

- remarque générale: lucifuge
- alimentation: omnivore, consomme de préférence les mêmes aliments que les humains; peut vivre 4 à 6 semaines sans nourriture.
- température: développement/activité optimale à 28°C; température préférentielle 25-33 °C, mais encore active à 21°C.
- refuge: endroits sombres, chauds, humides, calme et avec présence de nourriture. Ne grimpe pas facilement; se retrouve souvent dans les réseaux d'égouts.