

## **BLATTE GERMANIQUE (*Blattella germanica*)**

Famille: Blattellidae

Ordre: Dictyoptera

### **Généralités :**

- l'espèce de blatte la plus répandue, elle est lucifuge.
- rencontrée dans les habitations, entreprises, boulangeries, hôtels, restaurants, hôpitaux, navires et dans les dépôts d'immondices non contrôlés, ...

### **Aspect :**

- imago: brun clair ; rayures noires sur le thorax; longues antennes; taille 10-15 mm; mâles plus minces et extrémité de l'abdomen non complètement couverte par les ailes.
- larve: même apparence que l'imago, mais sans ailes et généralement de couleur plus foncée; 2-10 mm sans les antennes; mue entre 5 et 7 fois durant la croissance.
- œuf : l'oothèque est protégée par une coque chitineuse brun clair; taille: environ 8x3x2 mm, contient en moyenne 30 œufs.



### **Développement:**

- métamorphose incomplète
- stade ovaire: 2-5 semaines; les femelles adultes produisent en moyenne 7 (4-8) oothèques au cours de leur vie.
- stade larvaire: de 40 jours à 30°C à environ 6 mois à basse température.
- de l'œuf à l'imago: d'environ 2 mois à 25°C à environ 7 mois à basse température.
- longévité maximum de l'imago: 6 mois, en laboratoire jusqu'à 1 an environ.

### **Mode de vie:**

- alimentation: omnivore, denrées alimentaires, animaux morts, excréments humains et animales, déchets, graisse, etc.; peut vivre 10-40 jours sans nourriture;
- température: - 4 °C pendant env. 12 heures est généralement fatal; activité optimale vers 30°C; température préférée 25-32°C.
- refuges: endroits sombres, chauds, humides, calme et avec nourriture à proximité.