

## **BLATTE ORIENTALE (Blatta orientalis)**

Famille: Blattidae  
Ordre: Dictyoptera



### **Généralités:**

- présente surtout dans les zones subtropicales.
- moins fréquente chez nous que la blatte germanique.
- se rencontre notamment dans les habitations, entreprises, boulangerie, restaurants, navires, ...

### **Aspect:**

- imago: noir, longues antennes; taille 21 - 28 mm; les femelles ont de très petites ailes, les mâles ont des antennes qui couvrent les 2/3 de l'abdomen.
- larve: ressemble à l'imago sans ailes; couleur très foncée; mue entre 7 et 10 fois.
- oeuf: l'oothèque mesure environ 10x5x3 mm; contient en moyenne 16 oeufs.

### **Développement:**

- stade oeuf: 44 jours à 30°C; env. 80 jours à 20°C; mais peut aller de 4 mois à 2 ans; les femelles déposent 8 (5-20) oothèques dans leur vie.
- stade larvaire: 30°C : pour les mâles, 5 mois, et 9 pour les femelles. A 25°C, plus d'un an.
- de l'œuf à l'imago: Au moins 6 mois à 30°C; plus d'un an à 25°C et moins.
- longévité maximale: l'imago vit environ 2 mois à 30°C; 9 mois à 20°C.

### **Mode de vie:**

- remarques générales: lucifuge; ne grimpe pas bien sur les surfaces lisses.
- alimentation: omnivore, déchets, etc; peut vivre 2-4 semaines sans nourriture.
- température: - 4°C pendant 15 heures est souvent fatal; développement optimal à 25°C.
- refuges: dans des endroits un peu plus frais que la blatte germanique; endroits sombres, humides (surtout les caves, réseau d'égout, ...).