

## **LA FOURMI DES JARDINS (Lasius sp.)**

Lasius niger (La fourmi noire) →  
Sous-famille: Formicinae  
Famille: Formicidae  
Ordre: Hymenoptera (insectes à ailes membraneuses)



### **Généralités:**

- les fourmis de jardin se retrouvent partout en France, surtout sur les terrains sablonneux.
- les nids se trouvent hors des bâtiments.

### **Apparence:**

- ouvrières 3-4 mm, reine 7-9 mm, mâles 3-4 mm.
- couleur brun-noir pour les fourmis, brun foncé pour la reine, les mâles vont du brun foncé au brun-noir avec des ailes claires.

### **Développement:**

- métamorphose complète, colonie au repos en hiver, ponte au printemps et en hiver.
- vol nuptial: - juillet - août.
- l'état ovaire dure 3-4 semaines, l'état larvaire 2-3 semaines
- durée entre l'œuf et l'imago en été environ. 2 mois

### **Mode de vie**

- les mâles meurent après la copulation; la reine perd ses ailes, creuse un nid dans le sol
- les ouvrières cherchent la nourriture, la régurgitent vers une autre fourmi (trophallaxie)
- la reine pond ses oeufs et ne quitte plus le nid.

### **Nourriture:**

- surtout des produits sucrés, du miellat ("lait des pucerons")
- consomment également de petits insectes.