

## **LA PETITE VRILLETTE DU BOIS (*Anobium punctatum*)**

Famille: Anobiidae

Ordre: Coleoptera



### **Caractères généraux:**

Les larves de ce coléoptère creusent des galeries dans les meubles, les planchers en bois et autres ouvrages en bois et peuvent entraîner de sérieux dégâts. La présence de vrillettes se reconnaît aux petits trous ronds de 1 à 2 mm de diamètre qu'elles pratiquent dans le bois. elles attaquent autant le bois de conifères que de feuillus, mais ne détruisent que l'aubier. elles sont surtout attirées par le bois humide resté longtemps dans le même état. Les coléoptères adultes vivent entre 3 et 4 semaines.

### **Apparence:**

oeufs: de forme ovale et de couleur blanchâtre, ils mesurent entre 0,3 et 0,5 mm

larves: de couleur blanc sale, elles peuvent atteindre 7 mm de long.

adultes: couleur brun, mesurent entre 3 et 6 mm.

De corps sphérique, ces coléoptères ont une tête partiellement camouflée sous corselet qui se termine en pointe de profil (voir vrillette du tabac et du pain).

### **Développement:**

Métamorphose complète

Dans des conditions normales, on a constaté les phases de développement suivantes :

oeuf: 2-3 semaines

larve: environ 3 ans

stade pupal: 2-4 semaines

cycle de vie complet: environ 3 ans, jamais moins de 2 ans

La femelle pond 20 à 60 oeufs. Ceux-ci sont déposés en groupes de 3 à 4 oeufs dans les fentes et interstices du bois, ainsi que dans les anciens couloirs et les trous de vol.

Le développement larvaire dépend fortement de la température et de l'humidité. La température optimale s'élève à environ 23°C et l'humidité relative ne peut être inférieure à 60%.