

## **LE PIGEON Biset (Columba livia domestica)**

Famille : Columbidae (columbidés)

Ordre : Columbiformes (pigeons)



### **Apparence extérieure :**

- les pigeons domestiques devenus sauvages présentent une énorme diversité au niveau de la forme, de la couleur et du dessin, si bien qu'il est impossible d'en faire une description fidèle.

### **Développement :**

- plusieurs fois par an (maximum 8), la femelle pond deux œufs dans un nid fait de déchets.
- la fécondation couvre toute l'année sauf en période de grand gel.
- les œufs éclosent après 16 à 17 jours.
- après 18 à 24 jours, les petits peuvent voler.
- la durée de vie maximale du pigeon est estimée à 20 ans.
- en raison du manque d'ennemis naturels (surtout dans les villes) et de leur alimentation, une population réduite de pigeons peut vite se développer en véritable fléau.
- le pigeon et sa femelle forment généralement un couple qui dure jusqu'à la mort.

### **Mode de vie :**

- caractères généraux : de manière typique, le pigeon est un animal qui possède un très grand potentiel d'adaptation.
- nourriture : graines, jeunes pousses de plantes et de buissons, déchets d'aliments.
- lieu de nidation: sur toute surface plus ou moins plane et solide : murets de fenêtres, niches, balcons, statues, rebords, etc.; le nid est généralement constitué de déchets de plastique, papier, de branches, etc. mélangés à des excréments.
- territoire : chaque groupe de pigeons est dirigé par un chef et possède son propre territoire, qui n'est toutefois pas défendu contre les intrus. Le territoire a généralement un périmètre d'environ un 1 km.